

ANALYSE DES CINÉTIQUES DE COURBES POIDS

PERTE OU STAGNATION DE PERTE DE POIDS ?

OUI

Anamnèse

Dépister/Diagnostiquer une éventuelle dénutrition

Présence des critères ci-dessous ?

CRITÈRES ÉTIOLOGIQUES*

1 SEUL CRITÈRE SUFFIT

- ✓ Réduction > 50 % de la prise alimentaire pendant plus d'une semaine
- ✓ Réduction des apports alimentaires quantifiés pendant plus de 2 semaines
- ✓ Malabsorption/maldigestion intestinale
- ✓ Majoration des besoins protéino-énergétiques

CRITÈRES PHÉNOTYPIQUES*

1 SEUL CRITÈRE SUFFIT

- ✓ IMC \leq IOTF 18,5
- ✓ Perte de poids entre 5-10 % en 1 mois
- ✓ Perte de poids entre 10-15 % en 6 mois
- ✓ Stagnation pondérale avec perte de 2 et 3 DS

DÉNUTRITION MODÉRÉE

CRITÈRES PHÉNOTYPIQUES*

1 SEUL CRITÈRE SUFFIT

- ✓ IMC \leq IOTF 17
- ✓ Perte de poids > 10 % en 1 mois
- ✓ Perte de poids > 15 % en 6 mois
- ✓ Stagnation pondérale avec perte d'au moins 3 DS
- ✓ Infléchissement statural avec perte d'au moins 1 DS

DÉNUTRITION SÉVÈRE

OUI

DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE DE LA PATHOLOGIE CAUSALE

PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE

EN 1^{ère} INTENTION

Enrichissement de l'alimentation
(ajout de matières grasses, féculents... à chaque repas)

↓ SI INSUFFISANT

EN 2^{ème} INTENTION

Introduction de CNO Pédiatriques

INDICE DE WATERLOW

En cas d'absence de cinétique, mesurez l'indice de Waterlow

$$= \frac{\text{Poids mesuré}}{\text{Poids attendu pour la taille}}$$

- ✓ Si < 80 % → dénutrition modérée
- ✓ Si < 70 % → dénutrition sévère

Peser et mesurer l'enfant à chaque visite médicale jusqu'à ses 18 ans

NON

- 1 Rassurer et accompagner les parents
- 2 Revoir l'alimentation et donner des conseils nutritionnels aux parents
- 3 Programmer une nouvelle consultation dans le mois qui suit